

De meerwaarde van Paramée

In Paramée zijn ook kinderfysiotherapeuten, een kinderergotherapeut, een kinderpsycholoog en een diëtist werkzaam die eventueel ook ingeschakeld kunnen worden in de behandeling van deze groep kinderen. In samenwerking met de fysiotherapeut kan bijvoorbeeld gekeken worden naar een goede houding tijdens het eten.



Verwijzing

Voor preverbale logopedie is een verwijzing nodig van de huisarts of kinderarts. Medische oorzaken kunnen ook ten grondslag liggen aan de eet- en drinkproblemen.

Vergoeding

De behandelingen worden volledig en onbeperkt vergoed vanuit de basisverzekering. Met alle zorgverzekeraars zijn contracten afgesloten.

Afspraak maken

Kinderpraktijk Paramée
www.paramee.nl

Wognum
Westerspoor 13
1687 AZ Wognum
0229 284343
linda@paramee.nl

Wervershoof
Olympiaweg 141 L
1693 EK Wervershoof
0228 584380
julia@paramee.nl

Preverbaal logopedisten



Linda Steur



Julia Sijm

Ingeschreven in het Kwaliteitsregister Preverbale Logopedie bij de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF).



Paramée Kinderpraktijk

Logopedie



Preverbale logopedie



Wat is preverbaal logopedie?

Preverbaal betekent: voordat het spreken begint. In de loop van het eerste levensjaar leert een kind om allerlei soorten voedsel te eten en te drinken. Dit gaat niet altijd vanzelf. Het kan zijn dat een kind niet goed kan eten of drinken door een medische probleem. Ook kan het zijn dat hij/zij niet wil of durft te eten door negatieve of onprettige ervaringen.

Een preverbaal logopedist heeft aanvullende scholing gevolgd op het gebied van eet- en drinkproblemen. Wanneer er problemen zijn ten aanzien van het eten of drinken, kan een preverbaal logopedist worden ingeschakeld voor begeleiding, advisering en indien nodig behandeling.



Eet- en drinkproblemen

Preverbaal logopedie is bestemd voor baby's en jonge kinderen die moeite hebben met:

- Drinken uit de borst
- Drinken uit de fles
- De overgang van borst naar fles
- Eten van de lepel
- Kauwen
- Slikken
- Drinken uit een beker

Een kind kan bijvoorbeeld gaan kokhalzen, spugen, zich verslikken of voedsel weigeren.

We spreken hier vooral over baby's en jonge kinderen, maar ook oudere kinderen met eet- en drinkproblemen kunnen begeleiding krijgen van een logopedist. Eet- en drinkproblemen komen vaak voor bij te vroeg geboren kinderen, kinderen met het syndroom van Down en bij een schisis.



Onderzoek en behandeling

Als een kind wordt aangemeld, wordt eerst uitgebreid besproken wat het probleem is en wat de verwachtingen zijn. Tijdens het onderzoek wordt gekeken naar de aan- en afwezigheid van reflexen, de mondmotoriek, de spierkracht en het gevoel in en rond de mond. Daarnaast wordt het eten en drinken geobserveerd. Meestal komt de logopedist aan huis, aangezien dan meteen gekeken kan worden welke flessen, lepels enz. aanwezig zijn.



De logopedist adviseert de ouder(s) of verzorger(s) over de houding waarin en de wijze waarop het eten en drinken het beste gegeven kan worden.



Communicatieve ontwikkeling

Vanaf de geboorte is er sprake van communicatie tussen het kind en de mensen in de omgeving. Dit begint eenvoudig met kijken, huilen, lachen. Daarna leert een kind steeds meer om communicatie te gebruiken op verschillende manieren, bv. om te groeten, om aan te geven dat hij/zij iets wil, om gevoelens uit te drukken. Het kind gaat steeds meer taal begrijpen en anderen imiteren, eerst met geluiden, daarna met woorden.



Wanneer een kind moeite heeft met aspecten van beginnende communicatie, omdat hij/zij onvoldoende begrijpt of niet tot woordontwikkeling komt, is het raadzaam een preverbaal logopedist in te schakelen.